

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS/PNI/MS/2020

Vacinas		BCG	Hepatite B	Pentavalente	DTP	Poliomielite VIP e VOP	Pneumocócica 10	VORH Rotavírus	Meningocócica C	Febre Amarela	Triplice Viral	Tetra Viral	Hepatite A	Varicela (atenuada)	Pneumocócica 23	HPV	Meningocócica ACWY	Dupla Adulto	dTpa (adulto)
Protege contra		Formas graves da tuberculose	Hepatite B	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções pelo Haemophilus influenzae b	Difteria, Tétano e Coqueluche	Poliomielite	Pneumonia, Otite, Meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	Rotavírus	Doença invasiva causada pela N. meningitidis	Febre Amarela	Sarampo, Caxumba e Rubéola	Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela	Hepatite A	Varicela	Infecções invasivas pelo Pneumococo	HPV	Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis	Difteria e Tétano	Difteria, Tétano e Coqueluche
Grupo Alvo	Idade																		
Criança	Ao nascer	Dose Única (1)	Dose ao nascer (2)																
	2 meses			1ª dose (3)		1ª dose (VIP) (1)	1ª dose	1ª dose											
	3 meses								1ª dose										
	4 meses			2ª dose (3)		2ª dose (VIP) (1)	2ª dose	2ª dose											
	5 meses								2ª dose										
	6 meses			3ª dose (3)		3ª dose (VIP) (1)													
	9 meses									1ª dose									
	12 meses						Reforço (1)		1º Reforço (1)		1ª dose								
	15 meses				1º reforço (3)	Reforço (VOP) (1)						Dose única (1)	Dose única (1)						
	4 anos				2º reforço (3)	Reforço (VOP) (1)				Reforço				1 dose (3) e (7)					
	5 anos									Uma dose (5)	Duas doses (6)				Dose inicial (8)				
9 anos															2 doses (9)				
Adolescente	10 a 19 anos		3 doses (4)														1 dose entre 11 e 12 anos de idade (10)	3 doses, reforço a cada 10 anos (4)	
Adulto	20 a 59 anos		3 doses (4)															3 doses, reforço a cada 10 anos (4)	Profissionais de Saúde: 1 dose + reforços a cada dez anos (11)
Idoso	60anos ou mais		3 doses (4)											1 dose adicional (9)				3 doses, reforço a cada 10 anos (4)	
Gestante			3 doses (4)															2 doses (4)	1 dose a cada gestação (12)

(1) Até menor de 5 anos de idade;(2) Pode ser feita até 30 dias de vida do bebê;(3) Pode ser feita até menor de 7 anos de idade;(4) A depender da situação vacinal completar esquema;(5) Na faixa etária entre 5 a 59 anos de idade sem esquema vacinal - administrar uma dose e considerar vacinado;(6) Pessoas não vacinadas entre 5 a 29 anos de idade, administrar duas doses e, de 30 a 59 anos de idade o esquema é uma dose;(7) Pessoas a partir de 7 anos sem comprovação vacinal, administrar 1 ou 2 doses a depender do laboratório produtor;(8) Dose inicial a partir dos 5 anos de idade e uma dose adicional a partir dos 60 anos, considerando intervalo mínimo de 5 anos entre as doses;(9) Para meninas de 09 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos de idade, são duas doses - 0, 6 meses;(10) Para adolescentes na faixa etária de 11 e 12 anos de idade, com a vacina Meningocócica ACWY como dose única ou reforço, a depender da situação vacinal;(11) Profissionais de saúde e parteiras tradicionais, como dose complementar no esquema básico da dT e reforços;(12) A partir da 20ª semana gestacional (até 45 dias após o parto).